

Kweekschema bij eradicietherapie MRSA

- MRSA eradicaie 5 of 7 dagen
 - Dan minimaal 48 uur rust
 - **Daarna 1^o set controle kweken**
(‘era 1’ op aanvraag formulier zetten) afnemen: keel, neus en rectum
 - **Na negatieve uitslag 1^o set kweken:**
2^o set controle kweken (‘era 2’ op aanvraag formulier zetten) *
afnemen: keel, neus en rectum
 - **Na negatieve uitslag 2^o set kweken:**
3^o set controle kweken (‘era 3’ op aanvraag formulier zetten) **
afnemen: keel, neus en rectum
 - **Nadat de uitslag van de 3^o set bekend en negatief is, is er sprake van een matig verhoogd risico op dragerschap. Isolatiemaatregelen mogen dan opgeheven worden**
 - 2 maanden en 1 jaar na de 3^o set kweken, worden bij de patiënt nogmaals MRSA kweken afgenomen. Is de uitslag van deze 2 setjes negatief dan is er sprake van geen verhoogd risico op dragerschap = MRSA negatief
- * Na era 1 moeten er bij een medewerker minimaal 5 dagen worden aangehouden voor het afnemen van de volgende reeks kweken en bij een patiënt minimaal 7 dagen
- ** Na era 2 moeten er bij een medewerker minimaal 5 dagen worden aangehouden voor het afnemen van de volgende reeks kweken en bij een patiënt minimaal 7 dagen